


Vaksine mot koronavirus

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Koronavaksine anbefales dersom du

- er 75 år eller eldre
- bor på sykehjem
- er mellom 18-74 år og tilhører en risikogruppe
- er barn med alvorlig sykdom

Friske personer i alderen 65-74 år kan også få koronavaksine til redusert pris, dersom de ønsker det.

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du eller barnet ditt er i en risikogruppe, kan du lese mer på fhi.no eller spørre legen din.



Les mer på
fhi.no/voksenvaksinasjon

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom, vil avta over tid. FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig covid-19 tar en ny dose før vintersesongen.

Kan vaksinen gis samtidig med andre vaksiner?

Ja, koronavaksinen kan gis samtidig med vanlig influensavaksine og pneumokokkvaksine.

Hvor godt virker vaksinen?

Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19, men gir bare kortvarig beskyttelse mot å bli smittet eller smitte videre.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men det er ikke alle som får det. De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, er oftest milde til moderate, og går over etter noen dager.

Noen kan få kraftigere symptomer. De vanligste bivirkningene er smerte og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, diarré, muskelsmerter, frysninger, utmattelse, leddsmerter og feber. Alvorlige bivirkninger er sjeldne. Helsemyndighetene har kontinuerlig overvåking av mulige bivirkninger for alle vaksiner.

Hvor kan jeg få vaksine?

Se informasjon på nettsiden til din kommune om hvordan og når vaksineringen gjennomføres.

Vil du vite mer?

Spør legen din eller annet helsepersonell.